

تمهيد:

في هذه المحاضرة سوف يتم تناول المتوسطات المتحركة وذلك من خلال تناول المحاول التالية:

➤ تعاريف

➤ التنبؤ باستخدام المتوسطات المتحركة.

➤ المتوسطات المتحركة المرجحة.

➤ طريقة إختيار K.

➤ المتوسطات المتحركة الممركزة.

1. تعاريف:

1.1. طريقة المتوسطات المتحركة (Moving Averages method): تستخدم هذه الطريقة لتمهيد السلسلة الزمنية وبالتالي تمهيد خط الاتجاه العام للسلسلة من خلال تلخيصها من التقلبات الشديدة قصيرة الأمد التي تعاني منها السلسلة الزمنية.

2.1. تعريف المتوسط المتحرك: عبارة عن الوسط الحسابي لعدد من المشاهدات المتعاقبة في السلسلة بطول معين، هذا الأخير غالبا ما يكون 3 أو 4 وحدات زمنية (سنوات أو فصول ...). يفضل اختيار طول المتوسط المتحرك فرديا من أجل الحصول على متوسطات متحركة مركزية.

2. التنبؤ باستخدام المتوسطات المتحركة (Moving Averages method)

(t)	y	MA(k)
1	y ₁	-
2	y ₂	-
...		-
k	y _k	(y ₁ +y ₂ +...+y _k)/k
k+1	y _{k+1}	(y ₂ +y ₃ +...+y _{k+1})/k
K+2	y _{k+2}	(y ₃ +y ₄ +...+y _{k+2})/k
....	...	
n	y _n	(y _{n-k+1} +y _{n-k+2} +...+y _n)/k

تقوم هذه الطريقة على تحويل السلسلة الأصلية إلى سلسلة جديدة تتمثل في متوسطات لمجموعات جزئية من السلسلة الأصلية. هذه المجموعات لها نفس التعداد (K) وتترك كل مجموعة جزئية مع التي تليها في كل المفردات ما عدا القيمة الأولى والأخيرة. إذن استخراج المتوسطات المتحركة MA(k) لسلسلة Y هو استخراج بجوار السلسلة الأصلية سلسلة جديدة نقول

عنها محولة وهي كما يلي:

وهنا ينبغي التأكيد على ما يلي:

✓ عندما يكون طول المتوسط المتحرك الذي يتم اختياره عددا فرديا فإن المتوسط المتحرك يسمى بالمتوسط المتحرك

المركزي.


✓ كلما كان طول المتوسط كبيراً كلما أصبحت السلسلة الزمنية أكثر نعومة (Smooth)، ولكن في المقابل سيؤدي إلى فقدان بعض قيم السلسلة.

مثال 1: لديك رقم الأعمال الثلاثي لمؤسسة سياحية خلال ثلاث سنوات

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
yi	18	30	4	24	30	46	16	44	52	56	30	58

- حدد نافذة الموسمية واستخدمها لحساب المتوسطات المتحركة.
- مثل بيانيا السلسلتين الأصلية والمحولة بما فيها توقعات السنة المقبلة.

الحل: الشكل يبين وجود موسمية درجتها 4



مثال 2: البيانات التالية تمثل كمية استيراد الحديد (Y) خلال الفترة 2010-2015.

- ✓ أحسب المتوسطات المتحركة (MA) بطول 3 سنوات.
- ✓ أرسم السلسلة الزمنية الأصلية والمتوسطات المتحركة في شكل بياني واحد.

الحل:


✓ حساب المتوسطات المتحركة (MA₍₃₎)

t	Y	MA(3)
2010	100	/
2011	80	100
2012	120	113.33
2013	140	140
2014	160	140
2015	120	/

$$\bar{Y}_{2011} = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} = \frac{100 + 80 + 120}{3} = 100$$

وهكذا يتم حساب باقي المتوسطات المتحركة كما هو موضح في الجدول.

✓ الشكل البياني.



السلسلة الزمنية الأصلية (Y)

سلسلة الأوساط المتحركة (MA)

مثال 3: البيانات التالية تمثل قيمة المبيعات الفصلية لأحدى المؤسسات التجارية. (الوحدة: 10³ وحدة نقدية)

2017				2016				2015				الفصول
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	
10	20	18	16	18	12	10	20	10	16	14	12	المبيعات

المطلوب:

- أحسب المتوسطات المتحركة بطول (4) سنوات.
- ارسم السلسلة الزمنية الأصلية والمتوسطات المتحركة في شكل بياني واحد.

3. المتوسطات المتحركة المرجحة (MMP): في هذه الطريقة نقوم بإعطاء للزمن أو التواريخ أوزان مختلفة، فالتاريخ الأحدث يعطى وزن أكبر من التواريخ التي سبقتها. يمكن أن تكون الأوزان أعدادا طبيعية ويمكن لا، كأن تكون مثلا 5، 3، 1 أو 0.6، 0.3 و 0.1 وهكذا... إلخ. هذه الأوزان تضرب في القيم المقابلة لها لقيم الظاهرة المدروسة (Y)، ومن ثم نقسم على مجموع الأوزان عند حساب المتوسطات المتحركة.

مثال 4: لتكن لديك البيانات التالية لسهر سهم معين يوميا في إحدى البورصات عند الاقفال.

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Y	29	27	20	14	10	30	32	20	14	10	32	32

المطلوب:

- استخراج المتوسطات المتحركة المرجحة من الدرجة 3 بالأوزان 5، 3، 2.
- أحسب القيم المتوقعة لسعر السهم في الأيام 13، 14.

الحل:

Day	Y		MMP
1	29		-
2	27		-
3	20	$[(29*2)+(27*3)+(20*5)]/10$	23.9
4	14	$[(27*2)+(20*3)+(14*5)]/10$	18.4
5	10	$[(20*2)+(14*3)+(10*5)]/10$	13.2
6	30		20.8
7	32		27
8	20		25.6
9	14		19.4
10	10		13.2
11	32		21.8
12	32		27.6
13			27.6
14			27.6

الجدول التالي يبين كيفية حساب المتوسطات المتحركة المرجحة في هذه الحالة:

t	y	$\hat{Y} = MMP$
1	Y_1	-
2	Y_2	-
....	...	-
K	Y_k	$(y_1 + 2y_2 + 3y_3 + \dots + ky_k) / (k(k+1)/2)$
K+1	Y_{k+1}	$(y_2 + 2y_3 + 3y_4 + \dots + ky_{k+1}) / (k(k+1)/2)$
....
...	
n	y_n	$(y_{n-k+1} + 2y_{n-k+2} + 3y_4 + \dots + ky_n) / (k(k+1)/2)$

ملاحظة هامة: من الشائع في

السلاسل الزمنية عندما يكون K

كبير استخدام أوزان متناقصة

خطيا، بحيث يكون للقيمة

الأحدث وزن K وللقيمة الأقدم

وزن 1. في هذه الحالة يكون

مجموع الأوزان يساوي:

$$(1+2+3+\dots+k)=k(k+1)/2$$

4. طريقة اختيار K:

- في حالة المعطيات الفصلية تفضل أن تكون $k=4$;
- في حالة المعطيات الشهرية تفضل أن تكون $k=12$;
- في الحالات الأخرى نختارها بطريقة عفوية.

ملاحظة هامة: نشير إلى أن هذه الطريقة انتقدت على أساس أنها تمهد السلسلة اعتمادا على المشاهدات الماضية فقط، ولم تأخذ المستقبلية بعين الاعتبار.

تموضع السلسلة المحولة:

1.4. الطريقة الأولى (Trailing MA): تعرف هذه الطريقة بوضع المتوسط الأول للمجموعة الأولى مقابل التاريخ K والمتوسط الثاني الخاصة بالمجموعة الثانية مقابل التاريخ K+1، وهكذا حتى نصل للمتوسط الأخير مقابل التاريخ n.

2.4. الطريقة الثانية (centred MA): وهي بوضع متوسط المجموعة الأولى مقابل مركز المجموعة الأولى، أي

بتاريخ $(k+1)/2$ ، ومتوسط المجموعة الثانية في التاريخ الموالي وهكذا.

أما في حالة K زوجية، هنا لا تتطابق القيم المحولة مع ذات التواريخ في السلسلة الأصلية. لإعادة مطابقة تواريخ السلسلة

المحولة نقوم بالمركزة، وهي استخراج متوسطات من الرتبة 2 للمتوسطات المتحركة ذات الرتبة الزوجية. فمثلا لمركزة

MA(4) نستخرج لها متوسطات متحركة جديدة من الدرجة 2 وتسمى السلسلة الجديدة المتوسطات المتحركة المركزة

(Centered Moving Average).

5. المتوسطات المتحركة الممركزة (CMA): يمكن اختصار الحسابات في هذه الطريقة بقسمة القيمة الأولى والأخيرة في المجموعة على 2 وحساب المتوسط للقيم.

مثلا: في حالة $k=4$ فإن المتوسط المتحرك المركزي الأول يحسب كما يلي:

$$MA(4)_1 = (y_1 + y_2 + y_3 + y_4) / 4$$

أولا: نقوم بحساب المتوسط المتحرك من الدرجة 4 الأول

$$MA(4)_2 = (y_2 + y_3 + y_4 + y_5) / 4$$

والثاني.

$$CMA_1 = \left[\frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4}{4} + \frac{y_2 + y_3 + y_4 + y_5}{4} \right] / 2 \Rightarrow$$

ثانيا: نقوم الآن بالمركزة، أي حساب متوسط من الدرجة 2 للمتوسطات المتحركة الأول والثاني

$$CMA_1 = \frac{y_1 + 2y_2 + 2y_3 + 2y_4 + y_5}{8} \Rightarrow$$

$$CMA_1 = \frac{1}{8} (y_1 + 2y_2 + 2y_3 + 2y_4 + y_5) \Rightarrow$$

$$CMA_1 = \frac{1}{8} \left[2 \left(\frac{y_1}{2} + y_2 + y_3 + y_4 + \frac{y_5}{2} \right) \right] \Rightarrow$$

$$CMA_1 = \frac{1}{4} \left(\frac{y_1}{2} + y_2 + y_3 + y_4 + \frac{y_5}{2} \right)$$

وهكذا يتم حساب باقي المتوسطات المتحركة الممركزة لباقي التواريخ. فمثلا حساب المتوسط المتحرك الممركز للمتوسطين الثاني والثالث

$$CMA_2 = \frac{1}{4} \left(\frac{y_2}{2} + y_3 + y_4 + y_5 + \frac{y_6}{2} \right)$$

خلاصة: عند حساب المتوسط المركزي نقوم بجمع $(k+1)$ حد، حيث الحدين الأول والأخير هما نصفي القيمتين ونقسم على K .