

أهم الأمراض الفيروسية الشائعة على النباتات

Plant Diseases Caused by Viruses

إعداد

د. / محمد عبد الرحمن الوكيل

أستاذ أمراض النبات

كلية الزراعة – جامعة المنصورة

عضو اللجنة التنفيذية لشبكة المعلومات العلمية الآسيوية

Asian Network for Scientific Information (ANSInet) <http://www.ansinet.com>

رئيس تحرير دورية العلوم البينية والتكنولوجية

Editor in Chief - Journal of Environmental Science and Technology

رئيس تحرير دورية أمراض النبات الدولية

Editor in Chief - Plant Pathology Journal

عضو الجمعية الأمريكية للكيمياء

American Chemical Society (ACS)

عضو الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب

World Association of Arab Translators & Linguists

Web: <http://osp.mans.edu.eg/wakil>

E-mail: mawakil@mans.edu.eg

يناير 2010

الفيروس عبارة عن بروتين نووي **Nucleoprotein** صغير للغاية لا يمكن مشاهدته بالميكروسكوب الضوئي ويتكاثر في الأنسجة الحية فقط وله القدرة على أحداث المرض. وكل الفيروسات متطفلة داخل الخلايا وتسبب أعداداً كبيرة من الأمراض لكل التكوينات من الخلايا الحية إعتباراً من الكائنات الحية بدائية النواة حتى النباتات الكبيرة والحيوانات.

وبعض الفيروسات تهاجم الإنسان والحيوان أو كلاهما وتسبب لهما أمراضاً مثل الأنفلونزا **Influenza** — شلل الأطفال **Polio** — مرض الكلب **Rabies** — الجدري **Smallpox** — السنط **Warts**..... الخ.

أما البعض يهاجم النباتات وبعضها يهاجم الكائنات الحية الدقيقة مثل الفطريات والبكتيريا والميكوبلازما. العدد الكلي للفيروسات المعروفة حتى الآن حوالي 2000 وإن كان هناك فيروسات جديدة تكتشف كل شهر. وحوالي ربع هذا العدد (500 فيروس) تهاجم النباتات محدثة لها أمراضاً.

ويمكن لفيروس معين أن يصيب نباتات من نوع واحد أو عدة أنواع نباتية كما أن كل نوع نباتي عادة ما يهاجم بعدة أنواع من الفيروسات كما أن النبات الواحد يمكن أن يصاب بأكثر من فيروس.

بالرغم من أن الفيروسات عوامل مرضية تشترك مع الكائنات الحية الأخرى في قدرتها الوراثية على إزدياد أعدادها فإنها تسلك أيضاً سلوك الجزيء الكيماوي. وببساطة فإن الفيروسات تحتوى على حامض نووي وبروتين والأخير يعمل كغلاف يسمى **Capsid** حول جزيء الحامض النووي.

وبالرغم من أن الفيروسات يمكن أن تأخذ عدة أشكال فإنها غالباً ما تكون عصوية أو خيطية أو متعددة الأسطح أو متباينة عن هذه الأشكال.

تتركب الفيروسات إما من RNA أو DNA وفي كل فيروس من الفيروسات النباتية يوجد نوع واحد من أنواع البروتينات وبعض الفيروسات الكبيرة تحتوى على أكثر من نوع بروتينى ولكل بروتين دور مختلف عن الآخر.

والفيروسات لا تنتج أي نوع من التراكيب مثل الجراثيم ولكنها تتناسخ في داخل الخلايا الحية لتكوين فيروسات جديدة.

كما أنها تسبب أعراضاً مختلفة على النباتات ولكنها لا تقتلها بل تستهلك الغذاء من الخلايا. ولكنها تستخدم المواد الخلوية وتأخذ مكاناً في الخلايا محدثة خلل وإضطراباً يؤدي إلى تطور غير عادى في الخلايا والأعضاء النباتية.

صفات الفيروسات النباتية:

تختلف الفيروسات النباتية عن بقية مسببات المرضية في النبات ليس فقط في الحجم ولكن في الشكل. وأيضاً في البساطة في التركيب الكيماوي والطبيعي – وطرق العدوى والانتقال في العائل والانتشار كذلك في الأعراض التي تنتجها في النبات. وحيث أنها صغيرة جداً وشفافة فإنه لا يمكن مشاهدتها أو تقديرها بالطرق المعروفة والفيروسات ليست خلايا ولا تحتوى على خلايا.

تقدير الفيروسات:

- لا يمكن مشاهدة الفيروسات داخل النبات بواسطة الميكروسكوب الضوئي على الرغم من أن بعض الفيروسات تحتوى على أجسام كرسيتيلية (بللورية) يمكن مشاهدتها في الخلايا المصابة.
- عند عمل قطاعات أو أخذ عصير خلوي مصاب يمكن فحصه بالميكروسكوب الإلكتروني وعندئذ يمكن مشاهدة جزيئات الفيروس وقد لا يمكن مشاهدتها.
- الطرق الحالية لتقدير الفيروسات تعتمد على نقل الفيروسات من النباتات المصابة إلى السليمة بعدة طرق منها: 1 – البرعمة 2 – التطعيم 3 – المسح بواسطة العصير النباتي.
- توجد طرق أخرى للنقل بواسطة استخدام الحشرات الناقلة والنطاطات وذلك لإثبات وجود الفيروسات.
- معظم هذه الطرق لا تميز إذا ما كان المسبب فيروس أو ميكوبلازما أو **Fastidious vascular bacteria**. والأسلوب الأمثل هو مشاهدة المسبب المرضي. وتصبح الطريقة الأكيدة لإثبات وجود الفيروس في النبات هي التنقية ثم الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني وأيضاً بالطرق السيرولوجية.

مورفولوجيا الفيروسات:




Fig. 93 Relative shapes, sizes, and structures of some rept viruses. (A) Flexuous threadlike virus. (B) Rigid rod-shaped virus. (B-1) Side arrangement of protein subunits (PS) and nucleic acid (NA) in viruses A and B. (B-2) Cross-section view of the same viruses. HC, Hollow core. (C) Short, bacilluslike virus. (C-1) Cross-section view of such a virus. (D) Polyhedral virus. (D-1) Icosahedron, representing the 20-sided symmetry of the protein subunits of the polyhedral virus. (E) Geminivirus, consisting of twin particles.

- تأخذ الفيروسات النباتية أشكالاً مختلفة منها
عصويات صلبة Rigid rods أو علي
شكل خيوط متعرجة Flexuous
threads

أو Bacillus like أو كروية Spherical
(Isometric or Polyhedral).

- بعض الفيروسات المستطيلة مثل TMV
عبارة عن عصويات صلبة حجمها 15 X
300 nm.

- الخيطية المتعرجة مثل
Potato virus x (pvx) حجمها 10
– 30 X 480 nm

فيروس التراسيتيزا Citrus tristeza يصل طوله
إلى 2000 nm.

- الكرويات أقطارها تصل إلى 80 nm
وأقلها حوالي 17 nm.

الأشكال المختلفة والحجم النسبي للفيروسات النباتية

تركيب الحامض النووي للفيروسات النباتية:

معظم الفيروسات النباتية يتكون الحامض النووي فيها من RNA ويوجد حوالي 24 فيروس معروف أن
المادة النووية فيها هي DNA

الفيروسات المرافقة Satellite viruses

هي فيروسات مرافقة لفيروسات معينة تعتمد عليها في تناسخها وأحداث العدوى وغالباً ما تعمل على
خفض كفاءة الفيروس الأصلي في التناسخ و أحداث العدوى فهي تسلك سلوك الطفيل المصاحب للفيروس
الأصلي.

Viroids

عبارة عن Single Strand من RNA صغير جداً يتكون عادة من 250 – 400 نيوكليوتيد وهو قادر
على أحداث الأمراض النباتية.

Virusoids

تشبه الفيروسات فهي تتكون من RNA حلقي فردي لكنه يوجد داخل الفيروس نفسه المكون من RNA أي
أنه جزء من المادة الوراثية له وعليه فإنه لا يقوى بمفرده على أحداث عدوى كما أن الفيروس لا يقوى
على أحداث عدوى بدونه فهي علاقة تصاحب إجبارية.

Sateleite RNAs

عبارة عن RNAs صغير موجود في جزئي الفيروس (Virions) لبعض الفيروسات المركبة ويعتقد أن له علاقة بـ RNA النباتي وربما يكون هو المسئول عن حماية العائل من الإصابة الفيروسية.

إنتقال وتوزيع الفيروسات في النبات:

لحدوث العدوى فإنه على الفيروس أن ينتقل من خلية لأخرى وأن يحدث له تناسخ في معظم أن لم يكن كل الخلايا – أي ينتقل فيها. وفي حركته من خلية لأخرى يسلك طريقة خلال البلازموديمات Plasmodesmata (الخيوط الموصلة بين برتوبلاست الخلايا المتجاورة) وعليه فإن الفيروس لا يمكنه الانتقال من خلية لأخرى إلا إذا أصيبت الخلايا وحدث له تناسخ بداخلها ويحدث التحرك عادة بمعدل 1 ملليمتر/ يوم (8 – 10 خلية). وبمجرد دخول الفيروس إلى اللحاء فإنه يتحرك بسرعة تجاه مناطق النمو خاصة المرستيمات القمية أو إلى مناطق تخزين الغذاء مثل الدرناات والريزومات. فعلى سبيل المثال فإن فيروسات البطاطس عندما تصيب الأوراق القاعدية للنباتات السليمة فإن الفيروس يتحرك بسرعة إلى الساق ولكن عندما يكون النبات الدرناات فإن الفيروس لا يتحرك لأعلى ولكنه يتحرك تجاه الدرناات. وعلى أي حال فبمجرد دخول الفيروس إلى اللحاء فإنه ينتشر جهازياً في النبات.

أما حدوث أعراض موضعية للفيروس فهذا يشير إلى تواجد جزيئات الفيروس في هذا المكان وحدوث الإصابة حيث أنه في كثير من الحالات تمتد هذه الإصابات وتتسع لتتحول إلى أعراض مرضية وعائية.

ومن أمثلة الفيروسات ذات الإصابات الوعائية فيروس ألتفاف الاوراق في البطاطس Potato leaf roll (PLR). والفيروسات المسببة للموزايك ليست دائماً محدده الانتشار بل توجد أنظمة مختلفة لتواجدها وعندما يصيب الموزايك الخلايا فإن تعادده قد يصل إلى ما بين 100,000 – 10 مليون جزيء فيروس/ خلية. وبالرغم من أن التوزيع الجهازى لبعض الفيروسات يؤدي إلى الانتقال إلى جميع الخلايا الحية إلا أن بعض الفيروسات تترك في الأنسجة فراغات خالية من الإصابة. كما أن بعض الفيروسات يغزو الأنسجة المرستيمية القمية في الحال عقب العدوى بينما تظل مناطق النمو في الساق والجذور للنباتات في حالات أخرى المصابة خالية من الفيروسات.

الأعراض التي تسببها الفيروسات النباتية:

- أشهر الأعراض التي تسببها الفيروسات النباتية هي نقص معدل النمو في النباتات وبالتالي نقص إنتاجية المحاصيل لقصر عمر النباتات المصابة.
- التأثيرات السابقة ربما تكون شديدة بحيث يسهل مشاهدتها بالعين المجردة كما إنها قد تكون بسيطة جداً ويمكن مشاهدتها أيضاً.
- تظهر الأعراض عادة وبشدة على الأوراق ولكن في أحوال أخرى تسبب الفيروسات أعراضاً شديدة الوضوح على السيقان والثمار والجذور كما قد لا تظهر أعراضاً على الأوراق بالمرّة.


- معظم الأعراض التي تحدث في الحقول تكون نتيجة إصابة جهازه حيث ينتقل الفيروس جهازياً في النبات.
- عديد من الفيروسات تحدث عدوى لبعض العوائل دون ظهور أي أعراض مرئية عليها وتسمى هذه الفيروسات بإسم **Latent viruses** وتسمى العوائل في هذه الحالة **Symptomless carriers** .
- في أحوال أخرى نجد أن بعض النباتات المصابة تظل ذات مظهر سليم عقب العدوى وتسمى هذه الأعراض **Masked symptoms** إلا أنه في ظروف معينة من الرطوبة والحرارة يظهر عليها أعراضاً شديدة أو حادة تؤدي إلى موت النباتات كلياً .

ومن أشهر الأمراض الجهازية أمراض الموزايك **Mosaics**


ما هو الموزايك؟

هي مناطق خضراء فاتحة أو صفراء أو مناطق بيضاء ممتزجة بالأخضر العادي تظهر على الأوراق أو الثمار أو مناطق بيضاء ممتزجة بمناطق من الألوان للأزهار والثمار وأتماداً علي كثافة ونظام التلون فإن أعراض الموزايك توصف بأحد أو أكثر من الصفات الآتية:

- 1 – Mottling برفشة 2 – Streak تخطيط 3 – Ring pattern نظام حلقي
- 4 – Veinclearing ارتباط العروق شفافية العروق 5 – Vein banding
- 6 – Chlorotic spotting صفراء 7- Line pattern نظام خطي



التبقعات الحلقية





1 - Mottling برقشة




2 - Streak تخطيط

3 – Ring pattern نظام حلقي




4 – Veinclearing شفافية العروق



5 – Vein banding ارتباط العروق



6 – Chlorotic spotting تبقعات صفراء



7- Line pattern نظام خطي



انتقال الفيروسات النباتية:

لا تنتقل الفيروسات عن طريق الرياح أو الماء أو عن طريق بقايا النباتات إلى النباتات السليمة، ولكن لابد من حدوث خدش يسمح بدخول الفيروس إلى النبات.

وتنتقل الفيروسات بأحد الطرق الآتية:

- 1 — التكاثر الخضري.
- 2 — التكاثر الميكانيكي.
- 3 — عن طريق البذور.
- 4 — عن طريق حبوب اللقاح.
- 5 — عن طريق الحشرات
- 6 — عن طريق الحلم **Mites** والاكاروسات.
- 7 — عن طريق النيماتودا.
- 8 — عن طريق نطاطات الأوراق.
- 9 — عن طريق الفطريات

مقاومة الفيروسات النباتية

Control of Plant viruses

- تقاوم الأمراض الفيروسية عن طريق إبعاد الفيروسات عن العائل بإتباع أنظمة الحجر الزراعي والفحص المتكرر وإعتماد التقاوي. (**Quarantine , Inspection and Certification**)
- يصبح الحجر الزراعي في بعض الأحوال عديم الفائدة في حالة عدم ظهور أعراض مرئية علي البذور والدرنات والأبصال والشتلات.
- لتقليل اللقاح الفيروسي يتم التخلص من النباتات المصابة وأيضاً الحشرات والحشائش التي تعمل كعوائل ثانوية وكذلك تبخير التربة في حالة وجود نيماتودا ناقلة للأمراض الفيروسية.
- يعتبر إستخدام بذور ودرنات وأبصال الخ خالية من الإصابات الفيروسية أهم وسيلة للمقاومة.
- يمكن اللجوء إلى الطرق السيرولوجية لاختبار الامهات المستخدمة في إنتاج البذور بواسطة إختبار **ELISA**.
- من الثابت أن قوة أو صحة النباتات لا يعطيها صفة المقاومة أو المناعة للأمراض الفيروسية وأن تربية النبات المقاومة للأمراض الفيروسية ضرورة لا يمكن إغفالها في برامج المقاومة.
- في بعض العوائل فإن عدوى النباتات بسلالة مضعفة من الفيروس يحميها من شراسة السلالة الممرضة ويسمي ذلك بالحماية التهجينية **Cross protection**.
- أما في داخل النباتات نفسها فيمكن تثبيط الفيروس بالمعاملة الحرارية فعند تعريض الاجزاء التكاثرية للغمر في الماء الساخن لدرجة 35 — 54 م عدة دقائق أو ساعات يعمل علي التخلص من الفيروسات.

- توضع النباتات سريعة النمو في بيوت زجاجية عند درجات حرارة تتراوح بين 35 — 04 م ولمدة أسابيع أو أيام أو حتى أشهر حتى يصبح النبات سليماً خالياً من الإصابة الفيروسية.
- يمكن أيضاً إنتاج نباتات سليمة من النباتات المصابة بزراعة مرستيمات القمم النامية للبادرات والجذور بطول 0.1 ملليمتر إلى 1 سم علي درجة 28 – 30 م ، من خلال مزارع الأنسجة . Tissue Culture
- لا توجد مقاومة كيميائية متوافرة علي المستوي الحقلى بالرغم من أن بعضها مثل Ribavirin أعطي نتائج جيدة في مقاومة الفيروسات في الحقل.
- وجد أن رش منظمات النمو مثل Gibberellic acid ينشط النمو عن طريق تنشيط نمو النبات ويمنع تقدم المرض الفيروسي.

أهم الفيروسات التي تصيب المحاصيل

Virus diseases of tomato		1 — فيروسات الطماطم
ج - Tomato Ring spot	Tomato	أ — موزيك الطماطم Mosaic
د 0 Tomato Spotted wilt	Tobacco	ب — موزيك الدخان Mosaic

2 — فيروسات البطاطس Virus diseases of potato

تصاب بحوالي 20 فيروس و Viroids وأهمها:

- Potato Leafbroll virus
- Potato viruses Y & X
- Potato Spindle tuber viroids

3 — فيروسات العائلة القرعية Virus diseases of Cucurbits

الخيار والكوسة والقرع العسلي والكتالوب والبطيخ وهذه تصاب بحوالي 20 فيروس أهمها :

- Cucumber Mosaic
- Squash Mosaic
- Watermelon Mosaic

4 — فيروسات العائلة الصليبية Virus diseases of Crucifers

الكرنب والقرنبيط والفجل واللفت الخ وهذه تصاب بحوالي 6 — 8 فيروسات أهمها

- Turnip Mosaic
- Caulifeower Mosaic
- Radish Mosaic

5 — فيروسات العائلة البقولية Virus diseases of Legumes

الفاصوليا والبسلة والفاصوليا واللوبياء والفاصوليا السودانية والبرسيم الحجازي والبرسيم المصري. وهذه تصاب بحوالي 40 فيروس أهمها :

- Bean Common Mosaic virus
- Yellow Mosaic virus

6 — فيروسات البنجر Virus diseases of Sugar beet

يصاب بحوالي 15 فيروس — بعضها بسبب خسائر فادحة في الوزن وفي محتوى السكر وأهمها

- Beet Curly top
- Beet Yellows
- Beet Mosaic

7 — فيروسات الموالح Citrus Tristeza

تصيب كل أنواع الموالح وأهمها البرتقال والجريب فروت والليمون حيث يحدث موت وجفاف مفاجئ للأوراق والأفرع تؤدي إلى موت الأشجار.

8 — فيروسات الموز Banana Bunchy Top

— تسبب نقص شديد في المحصول.

اهم الامراض الفيروسية

قوباء الموالح: psorosis of citrus

تسبب هذا المرض عددا من سلالات فيروس قوباء الموالح حيث تظهر على الأوراق وهي في منتصف عمرها أو قبل ذلك بقع باهته وتكون مستطيلة على الفروع الصغيرة وتختفي هذه الأعراض تماما مع نمو الورقة، وتظهر إفرازات صمغية على الأوراق الكبيرة وتظهر على قواعد الأشجار تورمات صغيرة ينتشر عنها القلف ويظهر الخشب أسفلها بلون بني ومغطى بإفرازات صمغية.



بعض السلالات الفيروسية تسبب تكون حلقات باهته اللون على الأوراق مع تشققات طويلة بالقلف.

موزيك الطماطم: tomato mosaic

الاعراض:

يعتبر هذا المرض من أكثر الأمراض الفيروسية انتشارا في الطماطم خاصة في البيوت المحمية حيث ينتقل ميكانيكيا وبالأيدي وبالآلات وعن طريق التربة وتظهر الأعراض في شكل اضطراب في اللون الأخضر للأوراق و المجموع الخضري وعدم تجانس اللون الأخضر بها حيث تظهر مساحات خضراء قائمة متبادلة مع مساحات باهته ويكون نمو الأوراق والفروع غير طبيعي تظهر به تشوهات مختلفة ويكون الإنتاج ضعيف وتسقط الأزهار.



صور توضح موزيك الطماطم

الموزيك المخطط في القمح Striate Mosaic of Wheat

المسبب: فيروس الموزيك المخطط في القمح.

اعراض الاصابة:

وجود خطوط صفراء باهتة على الاوراق وعند اشتداد الاصابة تصفر الورقة كلها وينتج عن ذلك ضعف النباتات وقلة محصولها، اما اذا كانت الاصابة خفيفة فان النباتات تنمو وتخرج اوراقا جديدة وتختفي اعراض الاصابة وتوجد النباتات المصابة مبعثرة في الحقل.



طريقة الاصابة:

ينتقل الفيروس المسبب لهذا المرض بواسطة نوع من حشرات نطاط الورق، وقد اتضح من الابحاث التي اجريت على هذا المرض انه لا ينتقل بواسطة الطرق الميكانيكية او التربة او الشتلات.

المقاومة:

1. زراعة اصناف مقاومة.
2. عدم التبكير في الزراعة.
3. العناية بالتسميد حتى تصبح النباتات قوية المقاومة للمرض.