



Chapitre 2

Minimisation sans contraintes

Mourad AZI

2021

Table of contents

- 1 **Problème de minimisation sans contraintes**
- 2 Résultats d'existence
- 3 **Conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité**
 - Conditions nécessaires
 - Conditions suffisantes

Table of contents

- 1 **Problème de minimisation sans contraintes**
- 2 **Résultats d'existence**
- 3 **Conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité**
 - Conditions nécessaires
 - Conditions suffisantes

Table of contents

- 1 **Problème de minimisation sans contraintes**
- 2 **Résultats d'existence**
- 3 **Conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité**
 - Conditions nécessaires
 - Conditions suffisantes

Considérons le problème de minimisation (optimisation) non linéaire sans contraintes suivant :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x), \quad (1)$$

où $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction donnée.

Définition 2.1(Point minimum global)

x^* est appelée **point minimum global** du problème (1) si

$$f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$


et on note $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = f(x^*)$.

Définition 2.2(Point minimum local)

$x^* \in \mathbb{R}^n$ est appelé **minimum local** du problème (1) s'il existe un réel $\varepsilon > 0$, tel que :

$$f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in B(x^*, \varepsilon),$$

où $B(x^*, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R}^n, \|x - x^*\| \leq \varepsilon\}$ est la boule de centre x^* et de rayon ε .



Théorème 2.1 (Existence "Weiestrass")

Soit f une fonction continue sur un ensemble S non vide fermé et borné, alors f admet un point minimum global et un point maximum global sur S , c'est-à-dire $\exists x_1^*, x_2^* \in S$ tel que :

$$\forall x \in S, f(x) \geq f(x_1^*), f(x) \leq f(x_2^*).$$

Définition 2.3 (Fonctions coercive)

Soit $X \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble non borné et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est coercive sur X si on a

$$\lim_{x \in X, \|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty. \quad (2)$$

Théorème 2.2 (atteignement sous la coercivité)

Soit f une fonction continue sur \mathbb{R}^n tel que f est coercive :

$$\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad (3)$$

alors $\exists x^* \in \mathbb{R}^n$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, f(x) \geq f(x^*).$$





Table of contents

- 1 Problème de minimisation sans contraintes
- 2 Résultats d'existence
- 3 **Conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité**
 - Conditions nécessaires
 - Conditions suffisantes

Condition nécessaire du premier ordre

Théorème 2.3(Condition nécessaire du premier ordre)

Soit x^* est un minimum local (global) pour le problème (1), et si de plus f est continûment différentiable sur un ensemble S -ouvert contenant x^* ,

● alors

$$\nabla f(x^*) = 0. \quad (4)$$

Un point vérifiant la condition (4) est appelé point stationnaire.

Condition nécessaire du premier ordre

Théorème 2.3(Condition nécessaire du premier ordre)

Soit x^* est un minimum local (global) pour le problème (1), et si de plus f est continûment différentiable sur un ensemble S -ouvert contenant x^* ,

- alors

$$\nabla f(x^*) = 0. \quad (4)$$

Un point vérifiant la condition (4) est appelé point stationnaire.

Condition nécessaire du premier ordre

Théorème 2.3(Condition nécessaire du premier ordre)

Soit x^* est un minimum local (global) pour le problème (1), et si de plus f est continûment différentiable sur un ensemble S -ouvert contenant x^* ,

- alors

$$\nabla f(x^*) = 0. \quad (4)$$

Un point vérifiant la condition (4) est appelé **point stationnaire**.

Condition nécessaire du second ordre

Théorème 2.4(Condition nécessaire du second ordre)

Soit x^* un minimum local (global) pour le problème (1) de f sur \mathbb{R}^n et si de plus f est deux fois continûment différentiable sur S -ouvert $\subset \mathbb{R}^n$, contenant x^* ,

● alors

$$\nabla^2 f(x^*) \geq 0. \quad (5)$$

Condition nécessaire du second ordre

Théorème 2.4(Condition nécessaire du second ordre)

Soit x^* un minimum local (global) pour le problème (1) de f sur \mathbb{R}^n et si de plus f est deux fois continûment différentiable sur S -ouvert $\subset \mathbb{R}^n$, contenant x^* ,

- alors

$$\nabla^2 f(x^*) \geq 0. \quad (5)$$

Table of contents

- 1 Problème de minimisation sans contraintes
- 2 Résultats d'existence
- 3 **Conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité**
 - Conditions nécessaires
 - **Conditions suffisantes**

Conditions suffisantes d'optimalité

Théorème 2.5 (Conditions suffisantes d'optimalité)

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois continûment différentiable sur S -ouvert $\subset \mathbb{R}^n$, $f \in C^2(S)$.

Supposons que pour $x^* \in S$ les conditions suivantes sont vérifiées :

- $\nabla f(x^*) = 0$ (stationnarité) ;
- $\nabla^2 f(x^*) > 0$.

Alors x^* est un minimum local.

Conditions suffisantes d'optimalité

Théorème 2.5 (Conditions suffisantes d'optimalité)

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois continûment différentiable sur S -ouvert $\subset \mathbb{R}^n$, $f \in C^2(S)$.

Supposons que pour $x^* \in S$ les conditions suivantes sont vérifiées :

- $\nabla f(x^*) = 0$ (stationnarité) ;
- $\nabla^2 f(x^*) > 0$.

Alors x^* est un minimum local.

Conditions suffisantes d'optimalité

Théorème 2.5 (Conditions suffisantes d'optimalité)

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois continûment différentiable sur S -ouvert $\subset \mathbb{R}^n$, $f \in C^2(S)$.

Supposons que pour $x^* \in S$ les conditions suivantes sont vérifiées :

- $\nabla f(x^*) = 0$ (stationnarité) ;
- $\nabla^2 f(x^*) > 0$.

Alors x^* est un minimum local.