

الفصل الثالث: التطبيقات الخطية.

1. التطبيق الخطي.

فيما يلي، نفرض أن E و F فضاءين شعاعيين على نفس الجسم IK (IR أو C).

تعريف 1:

ليكن f تطبيق من E في F . نقول أن f هو تطبيق خطي من E في F إذا تحقق ما يلي:

$$\begin{aligned} 1) \quad \forall x, y \in E \quad & f(x+y) = f(x) + f(y). \\ 2) \quad \forall x \in E, \forall \lambda \in IK \quad & f(\lambda x) = \lambda f(x) \end{aligned}$$

ملاحظة:

ليكن f تطبيق خطي من E في F . لدينا:

$$\begin{aligned} f(0_E) &= 0_F. \\ \forall x \in E, \quad & f(-x) = -f(x) \end{aligned}$$

مثال:

$$f: IR^2 \rightarrow IR^3$$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = (x + y, x - y, y).$$

أثبت أن f تطبيق خطي.

f تطبيق خطي:

$$\text{لنضع } X = (x, y), Y = (u, v)$$

لدينا:

$$\begin{aligned} 1. \quad f(X+Y) &= f((x, y) + (u, v)) \\ &= f((x+u, y+v)) \\ &= (x+u+y+v, x-y+u-v, y+v) \\ &= (x+y, x-y, y) + (u+v, u-v, v) \\ &= f(x, y) + f(u, v) \\ &= f(X) + f(Y). \\ 2. \quad f(\lambda X) &= f(\lambda(x, y)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= f(\lambda x, \lambda y) \\
&= (\lambda x + \lambda y, \lambda x - \lambda y, \lambda y) \\
&= \lambda (x + y, x - y, y) \\
&= \lambda f(x, y) = \lambda f(X)
\end{aligned}$$

قضية 1:

يكون f تطبيق خطي من E في F إذا وفقط إذا كان:

$$\forall x, y \in E, \forall \alpha, \beta \in IK, \quad f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y).$$

2. تركيب تطبيقين خطيين.**نظرية 1:**

لتكن E, F, G ثلاث فضاءات شعاعية على نفس الجسم IK .
إذا كان f تطبيقا خطيا من E في F و g تطبيقا خطيا من F في G ، فإن التطبيق المركب $g \circ f$ هو تطبيق خطي من E في G .

مثال: ليكن E فضاء شعاعي ذو بعد منته على IK والعائلة $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ أساسا لـ E .
و $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ سلميات من IK . التطبيق f المعروف كما يلي:

$$f: E \rightarrow IK$$

$$x = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n \mapsto f(x) = \alpha_1 \lambda_1 + \dots + \alpha_n \lambda_n$$

حيث: $\lambda_i \in IK$ هو تطبيق خطي يقال عنه شكل خطي.

3. نواة وصورة تطبيق خطي.

ليكن E و F فضاءين شعاعيين على نفس الجسم IK . و f تطبيق خطي من E في F .

تعريف 2:

نسمي مجموعة الأشعة x من E حيث: $f(x) = 0$ بنواة التطبيق f ونرمز لها بالرمز $\text{Ker } f$ ونكتب:

$$\text{Ker } f = \{x \in E / f(x) = 0\} = f^{-1}(\{0\})$$

تعريف 3:

نسمي مجموعة الأشعة $f(x)$ حيث $x \in E$ بصورة التطبيق f ونرمز لها بالرمز $Im f$ ونكتب:

$$Im f = \{y \in F, \exists x \in E / f(x) = y = f(E)\}$$

قضية 2:

1. $Ker f$ فضاء شعاعي جزئي من E .

2. $Im f$ فضاء شعاعي جزئي من F .

مثال:

ليكن E فضاء شعاعي على IK و f_k التطبيق الخطي المعروف في المثال 1 السابق:

$$f_k : E \rightarrow E$$

$$x \mapsto f_k(x) = kx \quad (k \in IK)$$

إذا كان $k = 0$ ، f_k هو التطبيق المعلوم، و $ker f_0 = E$ ، $Im f_0 = \{0\}$

إذا كان $k \neq 0$ ، f_k هو تطبيق تقابلي، و $ker f_0 = 0$ ، $Im f_k = \{E\}$

مثال:

$$f : IR^2 \rightarrow IR^3$$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = (x, x, -x)$$

f تطبيق خطي، ولدنا:

$$Im f = \{Y \in IR^3, \exists X \in IR^2 / f(X) = Y\}$$

$$= \{Y \in IR^3, \exists X \in IR / (x, x, -x) = Y\}$$

$$= \{Y \in IR^3, \exists X \in IR / x(1, 1, -1) = Y\}$$

$$= \{x(1, 1, -1) / x \in IR\}$$

$$= vec \{(1, 1, -1)\}$$

$$Ker f = \{X = (x_1, x_2) \in IR^2 / f(X) = (0, 0, 0)\}$$

$$= \{(x_1, x_2) \in IR^2 / (x_1, x_1, -x_1) = (0, 0, 0)\}$$

$$= \{(0, x_2), x_2 \in IR\}$$

$$= \{x_2(0, 1), x_2 \in IR\}$$

$$= vec \{(0, 1)\}$$

قضية 3:

1. تطبيق غامر $\text{Im } f = F$ 2. تطبيق متباين $\text{Ker } f = \{0\}$

مثال:

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = (x, x, y)$$

التطبيق الخطي f متباين لأن:

$$\text{Ker } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = (0, 0, 0)\}$$

$$= \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, x, y) = (0, 0, 0)\}$$

$$= \{(0, 0)\}$$

لكن f ليس غامر لأن $(1, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$ و $(1, 2, 3) \notin \text{Im } f$ أي $\text{Im } f \neq \mathbb{R}^3$

4. رتبة تطبيق خطي.

فيما يلي، نفرض أن E و F فضاءين شعاعيين ببعد منته على نفس الجسم IK ، و f تطبيق خطي من E في F .

تعريف 4 :

نسعى بعد $f(E)$ بـ رتبة f ($\text{Rang } f$)، وندل عليها بالرمز $\text{rg}(f)$ ونكتب:

$$\text{Rg}(f) = \dim \text{Im } f$$

نظرية 2 :

$$\text{Rg}(f) = \dim \text{Im } f = \dim E - \dim \text{Ker } f$$

نتيجة 2:

$$\text{rg}(f) \leq \dim F \text{ و } \text{Rg}(f) \leq \dim E$$

$$f \text{ تطبيق غامر} \leftrightarrow \dim F = \text{rg}(f)$$

$$f \text{ تطبيق متباين} \leftrightarrow \text{rg}(f) = \dim E$$

نظرية 3:

ليكن $\dim E = n$ و f تطبيق خطي من E نحو E : القضايا التالية متكافئة:

1. f متباين.

2. f غامر.

3. f تقابلي (تشاكل).

4. $\text{rg}(f) = n$

5. صورة أساس في E بالتطبيق f هي أيضا أساس في E .